

la moraine, il s'est frayé un passage sous le glacier. Pendant les cinq années suivantes, il n'a pas reparu.

Nous avons visité le point de son ancienne sortie au début de juillet 1933 et en septembre 1934. Nous avons constaté que le glacier de Corbassière a beaucoup diminué dans toute sa partie inférieure. Son extrémité frontale n'a pas été mesurée régulièrement : en 1927 elle accusait un recul de 2 m., en 1928 3 m. 50, en 1930 10 m et 48 m. pendant les 3 années 1931-33. C'est surtout l'ensemble qui s'est amaigri et affaissé, on a l'impression que bientôt toute la région à forte pente va laisser apercevoir le fond rocheux.

En examinant l'ancien point de sortie, nous avons constaté que le torrent se frayait un passage à l'amont d'une masse rocheuse qui affleure au milieu des moraines. Celles-ci sont bouleversées, il semble que, à un moment donné, une langue de glace se soit dirigée de ce côté, coupant la grande crête morainique. La surface du glacier est actuellement enfoncée à peu près jusqu'au niveau de la découpe des moraines, il est donc très probable que la sortie du torrent ne pourra plus avoir lieu et qu'on ne verra plus la belle cascade de Corbassière.

D'autre part, malgré la diminution du glacier, on ne voit pas apparaître l'ancien lit du torrent sous la moraine, près du rocher de la cascade, comme nous le supposions en 1923.

Stations nouvelles pour la flore valaisanne

Pulmonaria angustifolia (L.) Signalé pour le Valais dans le catalogue Jaccard comme rare entre 1300 et 2000 m. dans 5 stations : Haut d'Arbignon, Fenestral, Mt Fully, alpes d'Ayent, sous Combire. Indiqué au col du Jorat par M. D. Coquoz. Je l'ai trouvé dans les mayens de Saxon, à l'ouest de la carrière de dalles de l'Arbarey et à Plan Bo (1000-1300 m.), puis à l'entrée de la vallée de Nendaz à Coor (780 m.) *Adonis aestivalis* L. Colline des Mala-deires, au-dessus du hameau de Châteauneuf. *Glyceria plicata* Fr. Commun dans le canal Sion-Riddes où il forme des touffes qui s'étendent sur l'eau. *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. Colline de Montorge, au pied de l'arête à l'est. Quelques exemplaires seulement en fleur le 4 juin 1931. *Orchis coriophorus* L. Trouvé le 21 mai 1932 sur la colline qui domine Evionnaz sous l'Epegnaz (500 m.) *Goodyera repens* R. Br. Derborence (Val de Triquent),

bois de pins sur l'éboulement vers les petits lacs à 1230 m. Forêt de Tourbillon s. Ovronnaz (1400-1500 m.). *Lathraea Squamaria* L. Entre Montagnon et les Places au-dessus de Leytron à 800 m., sous des ormeaux. Abondantes colonies observées le 4 avril 1932. Signalé à Leytron par Murith. *Petasites officinalis* Mönch. Au-dessus de Granois à Savièse (850 m.), le long des bisses, peu abondant. En fleur le 15 avril 1932. N'a pas été signalé sur le versant droit de la vallée du Rhône en amont de Fully sauf à Loèche. *Iris germanica* L. Au Plan des Pailles sur Charrat ; à Bieudron sur la colline du Dracocephalum. *Paris quadrifolia* L. A l'entrée du Val de Binn, rive gauche, entre Platten et le pont sur la Binna. Signalé seulement à Müllibach pour le district de Conches, Salins, sous le village, 600 m. *Euphrasia viscosa* L. Belle station observée au début de septembre 1932 sur l'arête boisée qui va de Tussoz à la chapelle de St-Bernard au-dessus de Vétroz-Ardon (850-950 m.) Forme des colonies parfois très serrées dans un bois de pins entre le sentier et l'arête sur une longueur de 150 m. environ. Terrain très ensoleillé et très sec, les autres plantes herbacées sont à peu près exclues ; dès qu'il y a assez de lumière et d'humidité pour permettre leur développement l'Euphrasie disparaît. *Aster Amellus* L. Entre Bieudron et Mortey (500 m.) sur la rive gauche du Rhône, territoire de la commune de Nendaz. *Vinca minor* L. Une colonie près des ruines d'une maison abandonnée depuis une dizaine d'années à Gerdy (500 m.) près d'Aproz. *Geranium divaricatum* L. Au bord d'un chemin dans les vignes au-dessus du Pont de la Morge (530 m.) Le catalogue Jaccard ne le signale pas sur la rive droite du Rhône. *Gentiana compacta* Hegetschw. Abondant près de la cabane Bernoud sur les bords du glacier de l'Oberaletsch où il était en pleine floraison le 24 septembre 1932 avec *Bupleurum stellatum*, *Solidago Virga-Aurea*, *Senecio incanus* et *Hieracium alpinum*. *Epilobium alsinifolium* Vill. abondant au bord du ruisseau de la Tzeudana à Zinal à 1680 m. *Selaginella selaginoides* (L.) Link. à la Plaine Madeleine sur Niouc. *Pyrola uniflora* L. à Grimentz et à Ovronnaz s. Leytron (1400 m.) *Pyrola secunda* L. sur Zinal. *Pinguicula grandiflora* Lam. et *Paradisica Liliastrum* (L.) Bert. au-dessous du chalet de l'Oïse à l'alpe d'Arpitetta sur Zinal, 2500 m. *Adenostyles tomentosa* (Vill.) Schinz. sur Zinal.

Coronilla varia L. à 1700 m. au-dessous de l'alpe de Ponchette, près du sentier qui descend à Niouc. *Astragalus glycyphyllus*

L. sur Niouc, sentier de Ponchette à 1600 m. *Scrophularia nodosa*
L. sur Niouc, sentier de Ponchette à 1500 m. *Gentiana camp-
estris* L., très abondant à la plaine Madeleine sur Ponchette, à 2000
m. *Gentiana cruciata* L., à Lirec et sur Grimentz. *Rhamnus alpi-
na* L. sur Chippis à 840 m. au bord du vieux chemin d'Anniviers,
au-dessus de la route actuelle. A Isigère sur Ardon, point 904,
sur la crête de la paroi qui domine Chamoson.

Geum rivale L. les Crêts sur Savièse, 1120 m. *Platanthera bi-
folia* Rchb. les Crêts sur Savièse, 1120 m. *Astragalus monspessula-
nus* L. Barne de la Zour sur Savièse, 1200 m. *Orchis maculatus*
L. et O. *incarnatus* L. les Crêts sur Savièze, 1120 m. *Orchis in-
carnata* L. var. *ochroleucus* vers le passage à niveau entre Ardon
et Châteauneuf et vers le canal Sion-Riddes sous la ferme des
Fougères. *Platanthera chloranta* Custer. dans le bois sous la cha-
pelle Ste-Marguerite à l'entrée du bisse de Savièse, 1100 m. Nou-
veau pour la région. *Ophrys arachnites* (Scop.) Host. sur Chando-
lin de Savièse, 1980 m.

Gentiana Cruciata L. dans la forêt du versant nord de l'Arde-
vaz au-dessus de Leytron, 900 m. *Gentiana ciliata* L., Ovronnaz.
Dracocephalum Ruyschiana L. au-dessus du bisse dans le vallon
de Corbassière (Bagnes).

Eritrichium nanum (All.) Schrader. Aiguilles de la Lex, 3100
m. Anniviers, dans la coupure au sommet du grand couloir, en
partie sur le versant de Moiry, 13 août 1934. Abondante floraison
de plantes diverses dans tous ces rochers. *Cirsium eriophorum*
(L.) Scop, sur Zinal sous l'alpe de Tracuit vers 1850 m. *Cirsium*
heterophyllum All. Alegi (Lötschen), 1660 m. *Pinguicula grandiflora*
Lam. Guggistafel (Lötschen), 1920 m. *Gagea saxatilis* K. Sur
la colline des Maladeires à l'ouest de Sion, deux petites colonies en
fleur le 19 mars 1933.

Gagea orvensis Schult. Champs de céréales sous Granois (Sa-
vièse), 820 m. *Colchicum autumnale* L. var *vernum* (Schränk).
Rchb. Une forte colonie près de la voie ferrée au nord du passa-
ge sous voie de Vétroz, début d'avril 1934. Quelques exemplaires
vers la partie supérieure du plateau de Savièse, 700-800 m. *Bul-
bocodium vernum* L. Pâturages de Leiggern sur Ausserberg, de-
puis les chalets, 1583 m. et dans toute la partie supérieure jusqu'à
1800 m. Immenses colonies pénétrant dans la forêt de Mélèzes.
Aussi à l'alpage de Lakern, 1630-1660 m., dans les mêmes condi-
tions. En plein floraison, le 13 avril 1934, Lousine s. Fully, 1600

m. *Anemone vernalis* L. Au-dessus de Leiggern (Ausserberg), 1620 m. *Gentiana utriculosa* L. Sommet du plateau de Savièse, au-dessus de Granois, 1100 m. *Epipactis latifolia* All. et *Cephalanthera rubra* Rich. Sur Saxon, bois de pin, 800 m. *Cypripedium Calceolus* L. Entre Vernamiège et Nax. *Ruscus aculeatus* L. dans les rochers exposés à l'est, près de Gueuroz, sous la route de Martigny-Salvan, Charfaz, 550 m. environ. *Heracleum Sphondilium* L. var. *stenophyllum* (Gaudin), Cottier sur Zinal, 1900 m. *Neottia Nidus avis* (L.). Sous le village de Salins, 600 m., et à Thomoz à l'ouest de Fey (Nendaz), 800 m. *Limodorum abortivum* (L.) Sw. Colline de Montorge, crête sud-ouest, 600 m.

A l'occasion de la réunion de la Murithienne à Chamoson, les stations suivantes ont été trouvées : *Ophrys muscifera* Huds. sous Neimiaz, à 850 m., un seul individu. (Mme Wavre). *Orchis pallens* L. à Izigières sur Ardon, 750 m. (M. Bocksberger O.). *Lathraea Squamaria* L. sous Neimiaz, 850 m. (M. Mariétan). *Anacamptis pyramidalis* Rich. probablement var. *vallesiaca* R. Buser, à Izigières, 750 m., (Mariétan).
